

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada pasien TB pengobatan awal didapatkan kadar CRP meningkat > 5 mg/L dengan rata-rata 30 mg/L sebanyak 12 orang (75%) dan kadar CRP normal ≤ 5 mg/L dengan rata-rata 2 mg/L sebanyak 4 orang (25%)
2. Pada pasien TB pengobatan lanjutan didapatkan kadar CRP tinggi > 5 mg/L dengan rata-rata 23 mg/L sebanyak 4 orang (25%) dan kadar CRP normal ≤ 5 mg/L dengan rata-rata 1,5 mg/L sebanyak 12 orang (75%).
3. Terdapat perbedaan kadar CRP yang signifikan antara pasien TB pengobatan awal dibandingkan pengobatan lanjutan metode FIA.

5.2 Saran

1. Bagi pasien TB diperlukan pemeriksaan CRP pada pengobatan awal maupun lanjutan untuk memantau keberhasilan terapi.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian kadar CRP pada pasien TB dari pengobatan awal hingga lanjutan yang diperoleh pada orang yang sama.