

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Jumlah ahli gizi terdiri dari 10 orang, dengan 8 orang menjadi sampel penelitian. 6 orang sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai PAGT dan 2 orang belum pernah mengikuti pelatihan mengenai PAGT.
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi ahli gizi yang sudah pernah mengikuti pelatihan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan.
3. Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi dan pengetahuan ahli gizi yang sudah pernah mengikuti pelatihan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan.
4. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara sikap ahli gizi yang sudah pernah mengikuti pelatihan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan.
5. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara pengetahuan ahli gizi yang sudah pernah mengikuti pelatihan dengan yang belum pernah mengikuti pelatihan

7.2. Saran

1. Dengan adanya peningkatan persepsi dan pengetahuan ahli gizi tentang proses asuhan gizi terstandar, maka dalam upaya peningkatan persepsi dan pengetahuan ahli gizi disarankan agar pihak rumah sakit baik dari bagian instalasi gizi ataupun manajemen rumah sakit dapat memberikan kesempatan secara berkala kepada ahli gizi, terutama kepada ahli gizi yang belum pernah mengikuti program pelatihan PAGT sama sekali, serta dilakukan sharing secara berkala sesama ahli gizi tentang PAGT.

2. Penelitian selanjutnya membandingkan pengetahuan, persepsi, dan sikap ahli gizi terkait PAGT dari berbagai rumah sakit yang memiliki ruang lingkup yang berbeda.