

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung
Jurusan Keperawatan Bandung
Program Studi Keperawatan Bandung
Bandung, Mei 2022
Tazkiah Aulia Utami. P17320119042

**TINDAKAN TERAPI DZIKIR ASMAUL HUSNA DALAM
MENGONTROL HALUSINASI PENDENGARAN PADA PASIEN
SKIZOFRENIA
DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**

ABSTRAK

xvii, 92 hal., 5 Bab, 2 bagan, 6 tabel, 1 diagram, 10 lampiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh angka kejadian skizofrenia berdasarkan RISKESDAS yang meningkat dari 1,7 per mil tahun 2013 menjadi 7 per mil tahun 2018. Tanda gejala positif yang menonjol pada pasien skizofrenia adalah halusinasi pendengaran. Halusinasi ini merupakan gangguan persepsi tanpa adanya rangsangan yang nyata. Jika pasien tidak mampu mengontrolnya maka berdampak pada pasien, dimana munculnya perilaku bunuh diri dan terganggunya kognitif, afektif, psikomotor, sosial serta spiritual. Salah satu cara mengurangi dampak halusinasi pendengaran dengan memberikan terapi dzikir asmaul husna. Tujuan studi kasus untuk mengetahui gambaran tindakan terapi dzikir asmaul husna dalam membantu pasien mengontrol halusinasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan terhadap 2 pasien yang mengalami halusinasi pendengaran. Intervensi yang diberikan berupa tindakan terapi dzikir asmaul husna selama 3 hari dengan waktu 10-20 menit. Untuk melihat perubahan tahapan halusinasi menggunakan kuesioner dan pedoman observasi. Hasil tindakan pemberian terapi dzikir asmaul husna terjadi penurunan tahapan halusinasi pada pasien 1 dari tahap III menjadi tahap I. Sedangkan pasien 2 dari tahap III menjadi tahap II. Dapat disimpulkan bahwa terapi dzikir asmaul husna dapat menurunkan tahapan halusinasi pendengaran. Disarankan kepada perawat untuk menggunakan terapi dzikir asmaul husna sebagai salah satu cara mengontrol halusinasi pendengaran.

Kata Kunci : Skizofrenia, Halusinasi, Dzikir Asmaul Husna.
Daftar Pustaka : 64 (2010-2022)

*Health Polytechnic Ministry of Health Bandung
Bandung Nursing Department
Bandung Nursing Study Program
Bandung, May 2022
Tazkiah Aulia Utami. P17320119042*

**ASMAUL HUSNA DHIKR THERAPY MEASURES IN CONTROLLING
HEARING HALUSINATIONS IN SCHIZOPHRENIA PATIENTS
IN WEST JAVA PROVINCE MENTAL HOSPITAL
IN 2022**

ABSTRACT

xvii, 95 p., 5 Chapters, 2 charts, 6 tables, 1 diagram, 10 appendices

This research was motivated by the incidence of schizophrenia based on RISKESDAS which increased from 1.7 per mile in 2013 to 7 per mile in 2018. Signs of positive symptoms that stand out in schizophrenic patients are auditory hallucinations. Hallucinations are perceptual disturbances in the absence of real stimuli. If the patient is not able to control it, it will have an impact on the patient, where the emergence of suicidal behavior and cognitive, affective, psychomotor, social and spiritual disturbances. One way to reduce the impact of auditory hallucinations is by giving Asmaul Husna dhikr therapy. The purpose of the case study is to describe the therapeutic action of dhikr Asmaul Husna in helping patients control hallucinations. The method used is descriptive with a case study approach. A case study was conducted on 2 patients who experienced auditory hallucinations. The intervention given was in the form of therapeutic remembrance of Asmaul Husna for 3 days with a time of 10-20 minutes. To see the changes in the stages of hallucinations using questionnaires and observation guidelines. The results of the action of giving Asmaul Husna dhikr therapy were a decrease in the stages of hallucinations in patient 1 from stage III to stage I. While patient 2 from stage III to stage II. It can be concluded that the therapy of dhikr of Asmaul Husna can reduce the stages of auditory hallucinations. It is recommended for nurses to use dhikr asmaul husna therapy as a way to control auditory hallucinations.

*Keywords: Schizophrenia, Hallucinations, Dhikr Asmaul Husna.
Bibliography : 64 (2010-2022)*