

**POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PROGRAM STUDI KEBIDANAN
BOGOR LAPORAN TUGAS AKHIR, JUNI 2024**

Bian Hanifa

NIM: P17324221008

**Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny. N 41 Tahun P4A1 Post Sectio Cesarea
dengan Hipertensi dan Anemia di RSUD Ciawi
6 BAB, 101 halaman, 6 lampiran, gambar 6, tabel 2**

ABSTRAK

Jumlah Kematian ibu di Indonesia tahun 2020 mencapai 4.267 kasus dan sekitar 23,9% disebabkan oleh hipertensi. Hipertensi post partum yang tidak teratasi dapat menyebabkan sejumlah masalah medis, seperti kerusakan organ, buta, penyakit jantung, kejang, stroke, dan bahkan kematian sehingga ibu harus melahirkan secara sectio cesarea. Tujuan disusunnya Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menerapkan asuhan kebidanan post partum pada Ny. N usia 41 tahun P4A1 post sectio caesarea dengan riwayat hipertensi dan anemia.

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dengan laporan kasus, disusun dalam bentuk Asuhan kebidanan pendokumentasian menggunakan metode SOAP, subjektif, objektif, analisa dan penatalaksanaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana, dokumentasi, dan studi literatur.

Hasil pengkajian data diperoleh data subjektif Ny. N 41 tahun mengeluh pusing dan nyeri luka jahitan, riwayat persalinan anak kelima pada 25 Maret 2024 pukul 08.45 WIB dengan hipertensi dan anemia. Data objektif diperoleh TD 130/90 mmHg, N 84×/menit, R 20×/menit, S 36,5°C, terdapat luka jahitan operasi tertutup verban, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi keras, terdapat nyeri tekan. genitalia terpasang kateter urine, terdapat lochea rubra. Pemeriksaan lainnya Hb 10,6. Analisa diperoleh Ny. N usia 41 tahun P4A1 post Sectio caesarea 2 hari dengan hipertensi dan anemia. Penatalaksanaan memberikan transfusi darah 250 cc 60 Tpm, mengajarkan mobilisasi dini, menganjurkan makan dan minum dan memberikan terapi obat oral sesuai advice dokter Cefadroxil 500 mg, Paracetamol 500 mg, Sulfat Ferro 500 mg, Nifedipine 10 mg.

Kesimpulan asuhan ini diperoleh hasil pemeriksaan pada postpartum 40 hari dengan Hb 11,3 gr/dL yang menunjukkan anemia ibu sudah teratasi, TD 160/100 mmHg hipertensi masih berkelanjutan. Saran untuk klien dan keluarga harus rajin kontrol kesehatan ibu ke faskes terdekat, memilih kontrasepsi yang non hormonal, dan keluarga untuk tetap memberikan dukungan kepada ibu.

Kata kunci : Anemia, Hipertensi, Post sectio caesarea

Pustaka : 39 (2018-2024)

**BANDUNG HEALTH POLYTECHNIC BOGOR MIDWIFERY STUDY PROGRAM
FINAL PROJECT REPORT, 21, JUNE 2024**

Bian Hanifa

ID : P17324221008

Postpartum Obstetric Care for Mrs. N 41 Years Old P4A1 Post Sectio Cesarea with a History of Hypertension and Anemia at Ciawi Hospital
VI CHAPTER, 101 pages, 6 Attachment, 2 tables, 1 picture

ABSTRACT

The number of Maternal Mortality Rates (MMR) in Indonesia in 2020 reached 4,267 cases with around 23.9% caused by hypertension in pregnancy. Hypertension that does not untreated post partum hypertension can cause a number of medical problems, such as organ damage, blindness, heart disease, seizures, stroke. The purpose of compiling this Final Project Report is to implement postnatal midwifery care for Mrs. N, 41 years old, P4A1 post sectio cesarea. with a history of hypertension and anemia.

The writing method used in preparing this final assignment report is a case report, prepared in the form of midwifery care documentation using the SOAP method, subjective, objective, analysis and management. Data collection techniques use interviews, observation, physical examination, simple laboratory examination, documentation, and literature study

The results of the data study obtained subjective data from Mrs. N, 41 years old, complained of dizziness and pain from stitching wounds, a history of giving birth to her fifth child on March 25 2024 at 08.45 WIB with hypertension and anemia. Objective data obtained was BP 130/90 mmHg, N 84×/minute, R 20×/minute, S 36.5°C, there was a surgical suture wound covered with bandage, TFU 2 fingers below the center, hard contractions, there was tenderness. genitalia had a urinary catheter installed, there was lochea rubra. Other tests Hb 10.6. Analysis obtained by Mrs. N aged 41 years P4A1 post Sectio caesarea 2 days with hypertension and anemia. Management provides a blood transfusion of 250 cc 60 Tpm, teaches early mobilization, recommends eating and drinking and provides oral drug therapy according to the doctor's advice. Cefadroxil 500 mg, Paracetamol 500 mg, Ferro Sulfate 500 mg, Nifedipine 10 mg.

Suggestions for clients and families are to diligently monitor the mother's health at the nearest health facility, choose non-hormonal contraception, and for the family to continue to provide support to the mother

Keywords : Post Sectio caesaree, Hypertension, Anemia

References :37 (2018-2024)