

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG
PROGRAM STUDI KEBIDANAN KARAWANG**

**PIPIT PRAMESSUARI
P17324417053**

**STUDI KASUS KEJADIAN KEK DENGAN PLASENTA PREVIA DAN
HIDRAMNION PADA IBU HAMIL DI KLINIK MUTIARA KASIH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020**

ABSTRAK

Latar Belakang: Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017, jumlah kematian ibu maternal yang terlaporkan sebanyak 696 orang (76.03/100.000 KH). Jawa barat pada tahun 2018 memiliki prevalensi KEK wanita usia subur sebesar 11,1%. Data yang di himpun dari dinas kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2019, kasus kematian ibu 24 kasus, dengan prevalensi KEK pada tahun 2007 sebanyak 13,7%. Berdasarkan data dari Klinik Mutiara Kasih Purwakarta tahun 2019, kehamilan dengan komplikasi yang meliputi KEK (25%), Plasenta previa (15%), dan Hidramnion (2%). Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. **Tujuan penelitian:** Mengetahui kejadian KEK dengan Plasenta Previa dan Hidramnion di Klinik Mutiara Kasih Kabupaten Purwakarta. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil Penelitian:** Kejadian KEK pada ibu hamil disebabkan riwayat pola makan yang tidak teratur, pemenuhan nutrisi yang kurang sebelum hamil dan selama hamil, pendapatan keluarga yang rendah sehingga tidak mampu membeli makanan sehat, pengetahuan yang kurang tentang nutrisi ibu hamil serta tidak memiliki beban kerja berlebih. **Kesimpulan:** Penyebab terjadinya KEK yaitu pola makan dan nutrisi, pendapatan dan pengetahuan. **Saran:** Memperhatikan pola makan yang teratur sesuai dengan isi piringku dan nutrisi yang harus dipenuhi ibu hamil sebanyak 3000 kalori perhari, meningkatkan pengetahuan mengenai pemenuhan nutrisi dan manfaatnya.

Kata Kunci : Ibu Hamil KEK, Pola Makan dan Nutrisi

Daftar Referensi : 45 (2007-2020)

