BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penilitian asuhan secara menyeluruh dari berbagai aspek terhadap Ny. T G3P2A0 dengan Preeklamsia dan Retensio plasenta di Bpm Bidan E Citeko Plered Pada Tahun 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor predisposisi tejadinya preeklamsia dan retensio palsenta dalam penelitian ini adalah usia dan paritas.
2. Penatalaksanaan preeklamsia pada penelitian Ny.T tidak sesuai dengan SOP dan kewenangan dikarenakan pada kasus Ny.T tidak dilakukan penanganan awal preeklampsia yaitu tidak diberikan mgSO4 dan tidak dilakukan rujukan.
3. Penatalaksanaan retensio plasenta pada Ny.T tidak sesuai SOP dikarenakan bidan tidak memberikan analgetik sebelum dilakukan manual plasenta untuk mengurangi rasa nyeri.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, maka muncul beberapa saran untuk pihak-pihak tertentu,diantaranya:

4.2.1 Bagi Tempat Praktek

Diharapkan agar tersedianya SOP sebagai acuan tindakan yang sesuai dengan standar yang telah di tetapkan sehingga Bidan tidak melanggar dan patuh terhadap ketetapan yang ada

4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian tentang faktor predisposisi serta gambaran penatalaksanaan preeklampsia dan retensio plasenta di Bpm Bidan E Citeko Plered diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan untuk menambah wawasan bagi seluruh civitas Poltekkes Kemenkes Bandung Prodi Kebidanan Karawang pada kasus preeklampsia dan retensio plasenta.