BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penilitian tentang gambaran faktor predisposisi pada partus prematurus dan retensio plasenta pada Ny. D G3P1A1 di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Tahun 2020 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor predisposisi terjadinya partus prematurus pada Ny.D G3P1A1 adalah usia ibu dan perokok pasif .
2. Faktor predisposisi terjadinya retansio plasenta pada Ny. D akibat partus prematurus, usia ibu, dan jarak kehamilan.

5.1 Saran

5.2.1 Tenaga Kesehatan

Diharapkan seluruh Bidan dapat mendeteksi kejadian Partus prematurus dan Retensio plasenta dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang usia ibu hamil resiko tinggi, kesehatan reproduksi wanita dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di dalam tatanan PHBS rumah tangga yaitu terdapat indikator tidak merokok didalam rumah dan memberitahu langkah gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yaitu dengan tidak merokok.

5.2.2 Institus

Sebagai bahan referensi dan pengetahuan oleh mahasiswi. serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dijadikan salah satu dari media belajar dalam proses belajar di institusi pendidikan.

5.2.3 Penulis

Semoga dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadikan pengalaman belajar baru bagi peneliti dan pengetahuan untuk mendalami faktor predisposisi pada partus prematurus dan retensio plasenta dapat dijadikan referensi juga untuk mengembangkan penelitian terkait