

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kadar glukosa pada serum lipemik trigliserida ± 1500 , ± 1750 dan ± 2000 mg/dL yang ditambah α -CD 1% dengan *pooled sera*.
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kadar glukosa pada serum lipemik trigliserida ± 1500 dan ± 1750 mg/dL yang tidak dengan yang ditambah α -CD 1%, kecuali pada serum lipemik trigliserida ± 2000 mg/dL.
3. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kadar glukosa pada serum lipemik trigliserida ± 1500 , ± 1750 dan ± 2000 mg/dL yang ditambah PEG 5% dengan *pooled sera*.
4. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kadar glukosa pada serum lipemik kadar trigliserida ± 1500 dan ± 1750 mg/dL yang tidak dengan yang ditambah PEG 5%, kecuali pada serum lipemik trigliserida ± 2000 mg/dL.
5. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kadar glukosa antara serum lipemik kadar trigliserida ± 1500 , ± 1750 dan ± 2000 mg/dL α -CD 1% dan PEG 5%.

5.2 Saran

1. Perlu dilakukan penelitian kadar glukosa pada serum lipemik trigliserida dibawah 1500 mg/dL.
2. Perlu dilakukan penelitian menggunakan sampel lipemik patologis.