

BAB V

SIMPULAN & REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penulis memperoleh dalam laporan kasus dan pembahasan pada Asuhan Keperawatan pada pasien DM tipe 2 dengan masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan adanya hiperglikemia pada pasien 1 dan 2 di RSUD Cibabat Kota Cimahi , maka penulis mengambil kesimpulan bahwa asuhan keperawatan pada pasien yang dilakukan dengan tindakan terapi pijat kaki dapat mengatasi ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dikarenakan pijat kaki dengan tekanan-tekanan pada area kaki akan memperlancar sirkulasi darah perifer sehingga mengatasi terjadinya luka diabetik, neuropati diabetik, dan komplikasi lainnya.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Bagi Pasien dan Keluarga

Diharapkan melalui hasil studi kasus ini pasien dan keluarga dapat menggunakan tindakan terapi pijat kaki secara mandiri di rumah untuk mengatasi masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer khususnya pada area kaki.

5.2.2 Bagi penulis selanjutnya

Diharapkan penulis selanjutnya karya tulis ilmiah ini dapat menjadikan sebagai acuan untuk salah satu alternatif dalam asuhan keperawatan khususnya dalam pelaksanaan intervensi tindakan terapi pijat kaki untuk mengatasi

masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer pada pasien diabetes melitus tipe 2.

5.2.3 Bagi bidang keperawatan

Diharapkan melalui karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber wawasan pengetahuan khususnya mengenai asuhan keperawatan pasien diabetes melitus tipe 2 khususnya dalam pelaksanaan tindakan pijat kaki untuk mengatasi ketidakefektifan perfusi perifer .