

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari teori mengenai asfiksia dan melakukan asuhan kebidanan secara langsung pada neonatus cukup bulan dengan asfiksia di PMB Bidan R. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Data Subjektif

Berdasarkan hasil data subjektif yang diperoleh pada pengkajian Ny. D didapatkan bahwa selama kehamilan ibu tidak memenuhi standar minimal kunjungan ANC dan tidak pernah melakukan pemeriksaan USG sehingga kehamilan ibu kurang terpantau, dan riwayat persalinan pada kala II ketuban bercampur mekonium, dengan lilitan talipusat kencang 1 kali.

2. Data Objektif

Data objektif yang didapat berdasarkan kondisi umum bayi yaitu dalam keadaan tidak segera menangis, tonus otot lemah, menunjukkan bahwa bayi mengalami asfiksia.

3. Analisa

Neonatus Cukup Bulan dengan Asfiksia

4. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan yang dilakukan adalah melakukan langkah awal resusitasi dan dilanjutkan dengan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi. Pada akhir asuhan bayi dalam keadaan baik tidak ada komplikasi selama asuhan pada bayi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran guna perbaikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia adalah sebagai berikut :

### **1. Untuk Pusat Layanan Kesehatan di PMB Bidan R**

Diharapkan bidan di Praktek Mandiri Bidan R dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan khususnya pada bayi baru lahir dengan asfiksia.

### **2. Untuk Klien dan Keluarga**

Disarankan untuk mampu memberikan asuhan bayi baru lahir sehari-sehari, dan mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir serta membawa bayi ke tenaga kesehatan bila hal itu terjadi.

### **3. Untuk Profesi Bidan**

Diharapkan bidan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya terutama dalam melakukan deteksi dini terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir serta dapat mempertahankan asuhan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan sehingga asuhan yang diberikan sesuai standar pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia, sehingga diharapkan dapat membantu menurunkan angka kematian pada bayi baru lahir.