

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG PROGRAM STUDI
KEBIDANAN BOGOR LAPORAN TUGAS AKHIR, JUNI 2022**

ARDANA AL FITRA

NIM : P17324219007

**ASUHAN KEBIDANAN PADA NY.R USIA 25 tahun G1P0A0 38 MINGGU
DENGAN PLASENTA LETAK RENDAH DI RSUD SEKARWANGI**

VI Bab, 62 halaman, 11 lampiran, 1 gambar

ABSTRAK

Perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam pada kehamilan di atas 28 minggu atau lebih. Pengelompokkan perdarahan terdiri dari plasenta previa, solusio plasenta, perdarahan pada plasenta letak rendah.¹ Tujuan penulisan laporan kasus ini untuk menerapkan Asuhan Kehamilan pada Ny. R usia 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu dengan Plasenta Letak Rendah di RSUD Sekarwangi.

Metodologi Penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini menggunakan metode pendokumentasian SOAP. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, dokumentasi, dan studi literature.

Data subjektif didapatkan Ny. R usia 25 tahun hamil anak pertama, tidak pernah keguguran. Ibu datang memeriksakan kehamilannya ke RS MTP pada usia kehamilan 20 minggu ibu mengalami keluar bercak darah berwarna merah segar tetapi ibu tidak merasakan mules, periksa kembali pada saat usia kehamilan 34 minggu dan melakukan USG yang dilakukan oleh dokter SpOG plasenta ibu letaknya tidak normal, sampai usia kehamilan 38 minggu ibu datang ke Rumah Sakit rujukan dari dokter SpOG didapatkan hasil USG plasenta letaknya tidak normal. HPHT 04-06-2021 TP 11-03-2022. Data objektif keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TD: 120/80 mmHg, N: 80x/menit, S: 36,5°C, TFU 31 cm. Palpasi Leopold teraba bokong, punggung di sebelah kanan, bagian bawah teraba kepala, konvergen perlimaan 4/5. Sehingga dapat ditegakkan Analisa Ny. R usia 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu dengan Plasenta Letak Rendah. Penatalaksanaan melakukan CTG sewaktu dengan hasil DJJ 158x/menit dan His 1x10'15" kemudian kolaborasi dengan dokter SpOG dan mengikuti *advice* yang diberikan yaitu terapi ekspetatif meliputi anjuran puasa, pengambilan sampel darah, pemasangan infus RL 20 tpm dan pemasangan *dower catheter* serta terminasi kehamilan dengan operasi *Sectio Caesarea* dan perawatan dilakukan sampai 3 hari post SC.

Kesimpulan hasil asuhan yang telah dilakukan, klien mengikuti semua anjuran dari bidan dengan kolaborasi dokter Sp. OG. Pada perawatan SC tidak terjadi infeksi, bayi dan ibu sehat. Diharapkan tenaga kesehatan meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien dengan Plasenta Letak Rendah serta melakukan rujukan secara cepat dalam penanganan lebih lanjut.

**Kata kunci : Kehamilan, Plasenta Letak Rendah
Perpustakaan : 20 (2010-2022)**

**HEALTH POLYTECHNIC MINNISTRY OF HEALTHY BANDUNG MIDWIFE
STUDY PROGRAM BOGOR FINAL PROJECT REPORT, JUNE 2022**

ARDANA AL FITRA

ID: P17324219007

**MIDWIFE CARE IN NY. R USIA 25 YEARS G1P0A0 38 WEEKS WITH LOWLY
PLACENTA AT SEKARWANGI HOSPITAL**

VI Chapter, 62 pages, 11 appendices, 1 image

ABSTRACT

Antepartum bleeding is vaginal bleeding at 28 weeks or more of pregnancy. The grouping of bleeding consisted of placenta previa, placenta abruption, bleeding on low-lying placenta. The purpose of writing this case report is to apply Pregnancy Care to Ny. R 25 years old G1P0A0 38 weeks pregnant with lowly placenta at RSUD Sekarwangi.

The writing methodology used in the preparation of this final report uses the case report method in the form of SOAP documentation. Data collection techniques using interviews, physical examination, observation, documentation, and literature study.

Subjective data obtained by Mrs. R is 25 years old, pregnant with her first child, never miscarried. The mother came for a pregnancy check at the MTP Hospital at 20 weeks of gestation. The mother experienced fresh red blood spots but the mother did not feel heartburn, checked again at 34 weeks of gestation and did an ultrasound performed by the SpOG doctor. The mother's placenta was located abnormally, until the age of 38 weeks pregnant the mother came to the referral hospital from the SpOG doctor, the results of the ultrasound of the placenta were abnormally located. HPHT 04-06-2021 TP 11-03-2022. Objective data good general condition, composmentis consciousness, BP: 120/80 mmHg, N: 80x/minute, S: 36.5°C, TFU 31 cm. Palpation Leopold palpable buttocks, back on the right, palpable lower part of the head, convergent fifths 4/5. So that the analysis of Mrs. R 25 years old G1P0A0 38 weeks pregnant with low-lying placenta. The management performed a CTG while with FHR 158x/minute and His 1x10'15" then collaborated with the SpOG doctor and followed the advice given, namely expectative therapy including fasting, blood sampling, RL 20 tpm infusion and insertion of a dower catheter and termination of pregnancy with Sectio Caesarea surgery and treatment was carried out up to 3 days post SC.

The conclusion of the care that has been done, the client follows all the recommendations from the midwife in collaboration with the doctor Sp. OG. In the SC treatment, there was no infection, the baby and mother were healthy. It is hoped that health workers will improve the quality of services in providing midwifery care to clients with low-lying placentas and make referrals quickly for further treatment.

Keywords: Pregnancy, Low-lying Plasenta

Bibliography : 20 (2010-2022)