

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG  
PROGRAM STUDI KEBIDANAN BOGOR  
LAPORAN TUGAS AKHIR, 06 JUNI 2023**

**Rimasayu Dwiana Fajarwati**

**NIM P17324220041**

**Asuhan Kebidanan Nifas pada Ny I usia 27 tahun P3A0 dengan anemia  
sedang di RSUD Sekarwangi**

**VI BAB, 65 Halaman, 3 Tabel**

**ABSTRAK**

Anemia merupakan komplikasi yang sering dialami oleh ibu nifas. Penyebab utamanya adalah infeksi pada masa nifas dan perdarahan saat proses persalinan. Pada tahun 2022 kasus komplikasi yang ditangani RSUD Sekarwangi dengan perdarahan postpartum 235 kasus (26,19%) dari 897 ibu yang bersalin secara spontan. Salah satu penyebab perdarahan terbanyak adalah anemia yakni sebanyak 117 (49,7%). Tujuan dari asuhan kebidanan ini adalah agar mampu memahami serta mengaplikasikan Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny. I usia 27 tahun P3A0 dengan anemia sedang di RSUD Sekarwangi.

Metode laporan kasus dimana penulis melakukan pendokumentasian secara sistematis dalam bentuk (SOAP) Subjektif, Objektif, Analisa, Penatalaksanaan.

Pada pengkajian data subjektif, Ny. I, usia 27 tahun melahirkan anak ketiganya, dirujuk dari Puskesmas Ciambar ke RSUD Sekarwangi dengan indikasi pendarahan pasca persalinan spontan. Ibu merasa pusing, lemas dan cemas mengalami perdarahan. Pemeriksaan tanda-tanda vital di batas normal, pemeriksaan wajah tampak pucat konjungtiva pucat sklera putih, gusi tampak pucat, pemeriksaan genitalia terdapat pengeluaran darah 150 cc, dan pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan hemoglobin kembali dengan hasil 8,7 g% Analisa yang dapat ditegakkan dari data subjektif dan objektif yaitu Ny. I usia 27 tahun P3A0 dengan anemia sedang. Penatalaksanaan yang dilakukan adalah memberikan terapi oral yaitu Amoxicilin 3x500 mg, tablet Fe 2x60 mg, mengobservasi keadaan umum, perdarahan, kontraksi uterus, konseling nutrisi, bagaimana cara minum tablet Fe yang benar.

Kesimpulan dari asuhan kebidanan pada anemia sedang yaitu dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama yang antara pihak klien dan bidan. Pada saat melakukan asuhan tidak ditemukan adanya kesenjangan anatara kasus dan teori. Disarankan bagi pihak klien mampu melaksanakan anjuran yang disarankan oleh bidan, seperti memantau tanda bahaya perdarahan, jika merasa pusing berlebih, lemas dan tanda bahaya nifas, selain itu bidan diharapkan mampu melakukan penanganan anemia sedang sesuai standar pelayanan dan wewenang bidan yang tepat.

**KATA KUNCI** : Asuhan Kebidanan, Nifas, Anemia  
Pustaka : 23 (2009-2021)

**HEALTH POLYTECHNIC MINISTRY OF HEALTH BANDUNG  
BOGOR MIDWIFERY STUDY PROGRAM  
FINAL REPORT, 06 JUNE 2023**

***Rimasayu DwianaFajarwati***

***Nim : P17324220041***

***Postpartum midwifery care for Mrs. I P3A0 with Moderate Anemia at Sekarwangi Regional Hospital  
VI Chapter, 65 Pages, 3 Tables***

**ABSTRACT**

*Anemia is a complication that is often experienced by postpartum mothers. The main causes are infections during the puerperium and bleeding during childbirth. In 2022 cases of complications handled by Sekarwangi Hospital with postpartum hemorrhage were 235 cases (26.19%) of 897 mothers who gave birth spontaneously. One of the most common causes of bleeding was anemia, which was 117 (49.7%). The purpose of this midwifery care is to be able to understand and apply Postpartum Midwifery Care to Mrs. I is 27 years old with moderate anemia at Sekarwangi Hospital.*

*case report method in which the author systematically documents in the form of (SOAP) Subjective, Objective, Analysis, Management.*

*Examination of vital signs within normal limits, examination of the face looked pale conjunctiva pale white sclera, lips looked pale, genital examination showed 150 cc of blood, vulva showed edema and supporting examination with hemoglobin examination returned with results of 8.7 g/dl% Analysis which can be enforced from subjective and objective data namely Ny. I, 27 years old P3A0 with moderate anemia. The management carried out was giving oral therapy, namely Amoxicillin, Ferrous Sulfate, observing the general condition, bleeding, uterine contractions, nutritional counseling, how to take Fe tablets, right.*

*The conclusion of midwifery care for moderate anemia is that it can be carried out well with the cooperation between the client and the midwife. At the time of providing care, there was no gap between cases and theory. It is recommended that the client is able to carry out the recommendations suggested by the midwife, such as monitoring for signs of bleeding danger, if you feel excessive dizziness, weakness and puerperal warning signs. In addition, midwives are expected to be able to handle moderate anemia according to service standards and the midwife's authority.*

**KEY WORDS : Midwifery Care, Postpartum, Anemia  
Literature : 23 (2009-2021)**