

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur pada profil terapi pada pasien arthritis dapat disimpulkan

1. Penyakit rheumatoid arthritis banyak menyerang kepada pasien perempuan dan banyak ditemukan pada usia dewasa. Pada pengobatan rheumatoid arthritis digunakan golongan obat DMARD, analgesik, OAINS, dan Kortikosteroid. Penggunaan obat yang paling banyak digunakan untuk golongan DMARD yaitu metotreksat, meloxicam untuk golongan OAINS, paracetamol untuk golongan analgesik dan metilprednisolon untuk golongan kortikosteroid.
2. Penyakit osteoarthritis banyak menyerang kepada pasien perempuan dan ditemukan pada usia 65 tahun keatas. Pengobatan osteoarthritis digunakan golongan obat OAINS, analgesik, suplemen dan kortikosteroid. Penggunaan golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu obat golongan OAINS. Penggunaan obat golongan OAINS yang paling banyak digunakan yaitu meloxicam, obat golongan analgetik yaitu paracetamol, obat golongan suplemen yaitu glukosamin dan obat golongan kortikostreoid hanya metilprednisolon.
3. Penyakit gout arthritis banyak menyerang pada pasien laki-laki dan banyak ditemukan pada usia dewasa. Pengobatan gout arthritis digunakan obat golongan antipirai dan OAINS. Obat yang paling banyak digunakan yaitu obat golongan antipirai yaitu allopurinol serta penggunaan OAINS paling banyak digunakan yaitu ketorolak.

5.2 Saran

Dikarenakan sampel yang digunakan hanya berlingkup nasional yaitu di Indonesia saja, untuk peneliti selanjutnya diharapkan digunakan sampel internasional sebagai perbandingan profil pengobatan di Indonesia dan internasional.